

Ficha Comercial

Cacao AGROSAVIA TCS 06

Árbol

Fruto



Mazorca abierta

Grano

Nombre comercial

Theobroma CORPOICA
La Suiza TCS 06

Nombre científico

Theobroma cacao L.

Seleccionador

AGROSAVIA

Origen

Colombia (Cóper - Boyacá)

Seleccionado a una altitud (m s. n. m.)

825

**Adaptación
(Subregiones naturales)**

Región Andina-
Subregión Montaña
Santandereana

Registro ICA

Resolución 001552 de 2014

Características de la Planta

Compatibilidad

Autoincompatible

Hábito de crecimiento

Baja Vigorosidad

Altura de la planta (m)

2.81

Diámetro del injerto (cm)

7.2

Arquitectura de la planta

Pendulada

Inicio de Floración

20

(meses después de establecimiento en campo)

Inicio de Producción

26

(meses después de establecimiento en campo)

Reacción a enfermedades

Muy baja incidencia a Monilia y
baja incidencia a Phytophthora

Exposición a la Luz

Susceptible

Características del fruto

Forma del fruto	Amelonado
Base del fruto	Sin constricción
Forma del ápice del fruto	Atenuado
Longitud del fruto (cm)	31
Ancho del fruto (cm)	10
Rugosidad del fruto	Semi rugosa
Color del fruto inmaduro	Tonalidades rojas con pigmentación verde
Color del fruto maduro	Rojo jaspeado
Grosor de cáscara hasta nivel del lomo (cm)	1.5
Forma de la semilla	Ovada
Ancho de semilla (cm)	1.3
Largo de Semilla (cm)	2.4
Color de la semilla	Rosado

Índices de producción

Número de semillas por fruto	47
Índice de grano (g) peso promedio de un grano seco	2.0
Índice de mazorca (Número de mazorcas para obtener 1 Kg de cacao seco)	12
Mazorcas sanas/árbol/año	24
Rendimiento/árbol/año (Kg)	2.1

Perfil sensorial

Aroma	Presenta un aroma dulce, maní, panela caramelo, ácido cítrico y frutal.
Sabor	Presenta sabores predominantes a cacao, notas de maní y almendras.

Recomendaciones de manejo

Es necesario realizar todas las prácticas agronómicas como: diseños de siembra apropiados en sistemas agroforestales, y con otros clones intercompatibles como el TCS 19 y TCS 01, manejo de sombríos, una poda de formación entre los 6 y 8 meses después de establecido en campo, seleccionando tres ramas principales a partir de 50 cm de altura y despuntes para fortalecer las ramas principales. Realizar podas de mantenimiento dos veces por año con un adecuado reparto de las ramas secundarias y terciarias, evitar excesos de poda y cortes agresivos. Realizar el control de enfermedades quincenal durante los picos de fructificación, además de una adecuada nutrición.

Restricciones

No establecer como cultivo monoclonal debido a su incompatibilidad. No establecer por ningún motivo a plena exposición solar.

Se recomienda su uso para cultivos en las zonas que cuentan con registro.

Datos de contacto

Teléfono: (+57) 601 914 4677

Correo Institucional: productos@agrosavia.co



Contacte su lugar más cercano:

Santander: 322 2331535