



Lulo La Selva

Nombre científico	<i>Solanum quitoense</i>
Nombre comercial	Lulo La Selva
Adaptación	1.200- 2.000 msnm
Características generales	
Periodo vegetativo	159-273 días
Rendimiento experimental	15,8 t/ha
Aparición de primeros brotes	60 días
Aparición botón apertura de flor	1,4 meses
Días o primera cosecha	240 días dependiendo de la altura msnm
Peso promedio/ fruto	55 gramos
Recomendaciones de manejo	
Densidad	1.666 plantas/ha
Propagación	En forma asexual o vegetativa a través de técnicas in vitro o en estacas basales de plantas mayores de 1 año sanas y vigorosas.
Distancia de siembra	3 metros entre surcos- 2 metros entre plantas.
Fertilización	Dependiendo del análisis de suelo. La planta responde a la aplicación de fertilizantes foliares.
Poda	De formación y mantenimiento eliminando tallos por debajo de los 60 cm.
Plagas y enfermedades	Tolerancia al ataque de nemátodos. Puede ser afectado por antracnosis o pudrición del fruto (<i>Colletotrichum gloesporioides</i>) se puede controlar mediante la recolección de los frutos afectados, control de malezas y aplicación de fungicidas. La pudrición algodonosa (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>) puede ser limitada. El perforador del fruto (<i>Neoleucinodes elegantalis</i>), el barrenador del cuello de la raíz (<i>Faustims aplicalis</i>) y el escarabajo de las flores (<i>Antonomus sp.</i>) son algunas de las plagas que afectan el cultivo.
AGROSAVIA, se excluye de responsabilidad por su uso o manipulación inadecuada lo cual recae única y exclusivamente en cabeza del cliente.	



Datos de contacto

WhatsApp (+57) 316 238 71 22

Correo Institucional: productos@agrosavia.co